

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr. 1/05.03.2026

**Pentru toate speciile pomicele** - in perioada de repaus vegetativ, respectiv de la căderea a 90% din frunze și până la "umflarea" a 1-5% muguri floriferi recomandam:

- **aplicarea măsurilor de igiena culturala ;**
- **efectuarea tratamentelor chimice "de iarnă".**

Înainte aplicării tratamentelor chimice se recomanda executarea **lucrărilor de igiena culturala** care constau in:

- eliminarea lăstarilor și ramurilor care prezinta simptome de rapăn, făinare, foc bacterian, a celor care prezinta ulceratii produse de păduchele lănos;
- la făinare tăierea se executa cu cel puțin 5 cm mai jos decât locul unde se observa atacul, pentru eliminarea ochilor ce ar putea fi infectați de la lăstarul bolnav ;
- incorporarea in sol a fructelor și frunzelor bolnave care prezinta simptome de bășicare, pătări, monilioza;
- protecția pomilor tineri împotriva rozătoarelor;
- eliminarea și arderea pomilor puternic virozați, a celor care prezinta simptomele unor boli de degenerescenta și a celor afectați integral de focul bacterian;
- adunarea și arderea cuiburilor de omizi defoliatoare;
- fertilizarea rațională cu îngrășăminte complexe (excesul de azot sporește sensibilitatea pomilor la boli și scade rezistenta acestora la înghețuri)
- la efectuarea tăierilor "in uscat" se va avea in vedere reducerea înălțimii pomilor, pentru facilitarea "îmbăierii" integrale cu soluția de stropit;
- instalarea brâielor capcana, pentru reducerea rezervei biologice de gărgărița florilor de mar și par;

**Tratamentele chimice** - pentru reducerea rezervei de agenți fitopatogeni (rapăn, monilioza, foc bacterian, bășicări, ciuruiri, pătări etc) se va aplica **un tratament chimic (noiembrie-aprilie)**

- **cu un fungicid cupric: ALCUPRAL 50 PU conc. 0,3% sau FUNGURAN OH 300 SC conc 0,3%, sau CHAMP 77 WG (COPPERMAX) conc 0,2%,** urmând ca in așa numitele « ferestre de iarna » (februarie – aprilie) până la fenofaza de « urechiușe de șoarece » la semințoase și « buton verde » la sămburoase sa se efectueze - **tratamentul chimic.**
- **cu ulei mineral și/sau insecticid** pentru combaterea dăunătorilor care ierneză in diferite stadii pe/in scoarța pomilor, larve hibernante ale păduchelui din San Jose (*Quadraspidiotus perniciosus*), oua de acarieni, etc. Pot fi utilizate următoarele **produse: OVIPRON TOP/VERNOIL conc. 2,5% (daca se aplica singur) sau 1.5% (daca se aplica in amestec cu un insecticid), la toate speciile pomicele.**
- **Pentru rozătoare** - in plantațiile unde se constata prezenta a 4-5 colonii /Ha se vor aplica momeli toxice **cu produsul ARVALIN - 5 bucăți/galerie.**

### OBSERVATII :

- Tratamentele trebuie efectuate pe timp liniștit, la viteze ale vântului mai mici de 5m/sec, la temperaturi mai mari de 4-6 °C.
- Verificați ,cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
- Conform Reg. CE nr.1107/2009,art.67,(1) , aveți obligația sa completați si sa păstrați pe o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protecția plantelor utilizate in „Registrul de evidenta a produselor de protecția plantelor”, după modelul:

### REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

| Data efect uării tratam (ziua luna, anul) | Cultur a și Locul unde este situat terenul | Timpul aplicării - fenofaza | Tratamentul efectuat                           |                        |                                  |                  | Numele, pre-numele pers. responsabili de efectuarea tratamentu lui, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. si data document prin care s-a dat în consum populație i |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                           |                                            |                             | Agentul de căunare: boli/ căunători / buruieni | Dinu mire pop folosi t | Doza Omol o gată /doza folosi tă | Supra fața, (ha) |                                                                               |                                              |                                                              |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

**Cantitatea de produs comercial** se va calcula pentru :

- 1500 l apa /Ha la speciile :mar, cireș, vișin, nuc ;
- 1000 l apa/Ha la speciile : par, gutui, prun, cais, arbuști fructiferi, pepiniere pomicole.
- **Vor fi respectate cu strictete normele de lucru cu produse de protecție a plantelor , pe cele de protecția mediului, animalelor.**

**VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL. PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI.**

**RESPONSABIL PROGNOZĂ - AVERTIZARE,**

Ing. Aurelian Valentin UNTARU

